BASDAI

(Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)

→ Questions :
Marquer d'un trait la réponse à chacune des questions en vous référant aux dernières 48 heures.

1. Où situeriez-vous votre degré global de fatigue ?

Absent |——————————————————————| Extrême

2. Où situeriez-vous votre degré global de douleur au niveau du cou, du dos et des hanches dans le cadre de votre spondylarthrite ankylosante ?

Absent |——————————————————————| Extrême

3. Où situeriez-vous votre degré global de douleur / gonflement articulaire en dehors du cou, du dos et des hanches ?

Absent |——————————————————————| Extrême

4. Où situeriez-vous votre degré global de gêne pour les zones sensibles au toucher ou la pression ?

Absent |——————————————————————| Extrême

5. Où situeriez-vous votre degré global de raideur matinale depuis votre réveil ?

Absent |——————————————————————| Extrême

6. Quelle est la durée de votre raideur matinale à partir de votre réveil ?

|——————————|——————————|

0 heure 1 2 heures ou plus

→ Mode de calcul :

- En premier lieu, calculer la moyenne aux réponses 5 et 6.
- Puis, calculer la moyenne des 5 valeurs (la valeur moyenne des réponses 5 et 6 et la valeur des réponses aux 4 premières questions).
- Le score va donc de 0 à 100.